

Teriflunomide +pharma, 14 mg, tabletki powlekane

Teriflunomid

KARTA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Imię i nazwisko pacjenta	
Data przepisania leku Teriflunomide +pharma po raz pierwszy	
Nazwa ośrodka	
Imię i nazwisko lekarza prowadzącego	
Numer telefonu lekarza prowadzącego	

Niniejsza Karta informacyjna dla pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku Teriflunomide +pharma. Pełne informacje przedstawiono w ulotce dla pacjenta.

Ogólne wskazówki

Należy pokazywać tę Kartę każdemu lekarzowi i (lub) osobie z fachowego personelu medycznego, uczestniczącym w leczeniu pacjenta (np. w przypadkach stanów nagłych).

Istotne działania niepożądane

Lek ten może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki krwi (krwinki), które są istotne dla zwalczania zakażeń. Z tego powodu, przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie krwi i pomiar ciśnienia tętniczego, a następnie regularnie je powtarzać.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

- Zażółcenie skóry lub białkówki oczu, ciemne zabarwienie moczu, nudności lub wymioty i bóle brzucha. W takim przypadku mogą u Pana/Pani występować problemy z wątrobą.
- Wysoka gorączka, drżenia, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszone lub bolesne oddawanie moczu lub dezorientacja. W takim przypadku może u Pana/Pani występować zakażenie.

Dotyczy wyłącznie pacjentek: ciąża

- Nie należy rozpoczynać stosowania leku Teriflunomide +pharma jeśli jest Pani w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. W celu potwierdzenia lekarz może poprosić Panią o wykonanie testu ciążowego.
- Podczas stosowania leku Teriflunomide +pharma należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.
- Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub będzie Pani podejrzewała, że jest Pani w ciąży, musi Pani **natychmiast poinformować o tym swojego lekarza.**
- W przypadku ciąży lekarz może zasugerować leczenie innymi lekami w celu szybkiego i wystarczającego wyeliminowania leku Teriflunomide +pharma z Pani organizmu.
- Powinna Pani również porozmawiać ze swoim lekarzem, jeśli planuje Pani karmienie piersią lub obecnie karmi Pani piersią.